


作り易く、形状・食味抜群の赤肉ハウスメロン

レガロ



品種特性

1. 根が強く生育旺盛で、短楕円形の低温肥大性に優れた、赤肉ネットメロンです。
2. ハウスや大型トンネルの這作りに適しています。
3. ネットは非常に密に安定して発現し、秀品率が高いです。
4. 果皮色は灰淡緑、果肉は橙赤色で繊維質が少なく食味がよいです。
5. 成熟日数は開花後55～57日程度で、収穫5日後より食べ頃となり、日持ちが持続します。
6. つる割病(レス0・2)に抵抗性、うどんこ病には比較的強い品種です。

栽培ポイント

1. 草勢が若干強いため、多肥は避け過繁茂に注意する。
2. 定植から交配期までは極端な乾燥にならない程度の灌水量にし、極端に蒸し込んだ管理は避け、ゆっくり生育させて根を深く張らせる。交配前から少し高めの温度管理とし、着果とその後の果実の肥大を考え、茎葉を少しやわらかめに保つ。
3. 着果後から縦ネット発生期までにムラのない灌水に心がけ、初期肥大を促進する。縦ネット発生期の灌水や蒸し込み管理は、ヒルネットの発生につながるので注意が必要。その後は草勢を落とさないような温度と水管理に注意する。
4. 収穫の目安は、成熟日数、結果枝第1葉の黄化・褐変(マグネシウム欠乏症)であるが、最終的には必ず試し切りを行う。葉が健全であれば、15～17度の糖度は十分可能で若どりは禁物。

※作型表は栽培方法、地域で若干異なることがあります。

作型

地域 \ 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道地区 (標準)			●	▲			■					

● 播種時期

▲ 定植時期

■ 収穫時期



住化農業資材株式会社

<http://www.sumika-agrotech.com/>

【本社】

〒541-0043

大阪市中央区高麗橋4-6-17

Tel. 06-6204-1877

Fax. 06-6204-0166

【北海道営業所】

〒067-0022

北海道江別市江別太698

Tel. 011-382-2541

Fax. 011-382-1161